Supplementary Table 1. Intubation, Hemodynamic Changes, and Complications in Groups MG and TW

	Group MG	Group TW	*P* value
Intubation success at first trial, *n* (%)	59 (93.7)	51 (85)	.119
Duration of intubation (sec), mean (min–max)	14 (5–60)	36 (20–80)	< .0001
Heart rate, HR, bpm			
Pre-induction	93.98 ± 13.42	92.93 ± 14.56	.525
Post-induction	85.52 ± 15.90	78.18 ± 12.40	.005
3rd minute	87.27 ± 12.44	89.78 ± 17.77	.678
5th minute	82.97 ± 15.86	78.35 ± 11.55	.364
10th minute	82.57 ± 12.59	76.12 ± 12.22	.069
Mean arterial pressure, MAP, mmHg			
Pre-induction	91.83 ± 16.50	99.78 ± 20.82	.402
Post-induction	84.86 ± 19.72	81.13 ± 22.50	.330
3rd minute	83.67 ± 13.06	91.95 ± 23.37	.020
5th minute	79.87 ± 13.97	79.93 ± 15.46	.016
10th minute	77.65 ± 11.46	76.30 ± 12.21	.982
Complications, %	19	35	.046
Sore throat	9.5	16.6	.046
Laryngospasm	.58	0	.046
Desaturation	3.17	11.6	.046
Blood on blade	4.7	6.6	.046

Data are presented as mean ± SD for HR and MAP. Complications are presented as percentages.