Hanging Teardrop

Asılı Gözyaşı Damlası

Blowout Kırığı / Blowout Fracture

Fevzi Yılmaz, Engin Deniz Arslan, Ali Demir
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye

33 yaşında erkek hasta acil servise darp sonucu maksillofasiyal yaralanma şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenesinde sol periorbital hassasiyet, ödem ekimoz ve subkonjoktival hemorajisi mevcuttu. Görme fonksiyonu ve göz hareketleri normaldi. Çekilen direkt x-ray grafileri normal olarak değerlendirildi (figure1). Aksiyal ve Koronal CT kesitlerinde sol orbita taban kırığı, yumuşak dokunun maksiller sinüse doğru prolobe olduğu saptandı (hanging teardrop) (Figure2). Ayrıca sol maksiller sinüste hava-sıvı seviyesi tespit edildi (Figure3). Blow-out kırığı tanısında radyolojik olarak yumuşak doku değişiklikleri kırığın kendisinden daha kolay görülür. Bizim vakamızda hastanın çekilen direkt x-ray grafileri normal olarak değerlendirilmesine rağmen çekilen tomografisinde orbita taban kırığı ve maksiller sinüs içine orbital yağın herniasyonu sonucu asılı gözyaşı damlası (hanging teardrop) tespit edildi. Kuvvetli fizik muayene bulguları olan künt orbita travmalarında tanısı şüpheli olgularda direkt x-ray grafilerinin yanında Aksiyal ve Koronal CT'de çekilmelidir.



Figure1: Hastanın direkt x-ray grafileri normal olarak değerlendirildi.




Figure2: Aksiyal ve Koronal CT kesitlerinde sol orbita taban kırığı, yumuşak dokunun maksiller sinüse doğru prolobe olduğu saptandı (Hanging Teardrop).




Figure3: Sol maksiller sinüste hava-sıvı seviyesi tespit edildi.

DOI: 10.4328/JCAM.1278 Received: 01.09.2012 Accepted: 16.09.2012 Printed: 01.07.2014 J Clin Anal Med 2014;5(4):359
Corresponding Author: Fevzi Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, 06100 Altındağ, Ankara, Türkiye.
GSM.: +905055907307 F.: +90 3123125346 E-Mail: fevzi_yilmaz2002@yahoo.com