Original Image
JCAM

Ortner Syndrome Due to Aortic Aneurysms


Aort Anevrizmasına Bağlı Ortner Sendromu

Ortner Syndrome Due to Aortic Aneurysms

Levent Özdemir[1], Burcu Özdemir[2]
[1]Göğüs Hastalıkları, Dörtyol Devlet Hastanesi, [2]Göğüs Hastalıkları, İskenderun Devlet Hastalıkları, Hatay, Türkiye

Ortner sendromu; sol rekürren larengeal sinirin sol atrium hipertrofisi, pulmoner hipertansiyon yada aort anevrizması gibi kardiyak patolojilere sekonder olarak pulmoner arter ile aort yada aortik ligaman arasında sıkışması sonucu, sol vokal kordda paralizi ve buna bağlı ses kısıklığı gelişmesi olarak tanımlanmaktadır.

77 yaşında erkek hasta, göğüs ön bölgede ağrı, öksürük, nefes darlığı ve ses kısıklığı nedeni ile değerlendirildi. Özgeçmişinde 40 paket yıl/ sigara ve hipertasinyon mevcuttu. Fiziki muayenesinde bilateral tüm zolarda ronküs mevcuttu. İndirekt laringoskopik bakısında sol kord vokalde paralizi saptandı. Aortaya yönelik yapılan BT anjiyoda arkus aortada 7.5 cm lik parsiyel tromboze anevrizma ve anevrizmaya sekonder pulmoner trunkus ve sol ana pulmoner artere belirgin basılanma mevcuttu.



Resim 1-4. Arkus aortada 7.5 cm lik parsiyel tromboze anevrizma ve anevrizmaya sekonder pulmoner trunkus ve sol ana pulmoner artere belirgin basılanma

DOI: 10.4328/JCAM.3869 Received: 12.09.2015 Accepted: 29.09.2015 Printed: 01.02.2016
Corresponding Author: Levent Özdemir, Göğüs Hastalıkları, Dörtyol Devlet Hastanesi, Hatay, Türkiye.
GSM: +905333888984 E-Mail:Levent2408@mynet.com